



# ProlapLase<sup>®</sup>

A kismedencei süllyedésses szervek Er: YAG SMOOTH lézer kezelése

Az előzetes klinikai tanulmányok igazolják, hogy a kezelés hatásos, könnyedén elvégezhető és biztonságos eljárás.

- hatékony, alternatív megoldás a műtéti beavatkozással szemben,
- a hüvely-csatorna foto-termikus feszesítése
- metszésmentes, a szöveteket nem sértő beavatkozás
- nincs szükség érzéstelenítésre
- ambuláns, felépülési időt nem igénylő beavatkozás
- biztonságos, gyors és egyszerű kezelés
- magas páciens elégedettség



A kismedencei süllyedékes szervek Er: YAG SMOOTH lézer kezelése

A kismedence kötőszövetei és izomzata, beleértve a hüvely szöveteit, különböző szerveknek, húgyhólyag, méh, végbél nyújt alátámasztást. Az életkor előrehaladtával, illetve a szülések, erős fizikai megterhelés hatására a hüvely kötőszöveti veszítenek rugalmasságukból, megereszkednek, megnyúlnak, ezáltal a hüvelycsatorna elveszti rugalmasságát, tágabbá válik, a fenti szervek elődomborodnak, ezt nevezzük előesésnek, prolapsusnak. Súlyosabb esetekben az előre eső szervek megjelennek a hüvelybemenetnél, hüvelyi teltségérzetet okozva.

### Mi az ProlapLase®?

A **ProlapLase®** egy innovatív és egyedülálló, szabadalmaztatott, szöveteket nem sértő ErYAG lézerterápiás eljárás. A hüvelyszövetek és hüvelycsatorna metszésmentes, a szöveteket nem sértő, foto-termikus feszesítésén és a kollagén rostok zsugorításán alapul. Az előzetes klinikai tanulmányok igazolják, hogy a kezelés hatásos, könnyedén elvégezhető és biztonságos eljárás.

### A ProlapLase® egyedülálló előnye páciense számára

Ambuláns beavatkozás, nincs szükség altatásra, leggyakrabban a változó kort követően jelentkeznek, ilyenkor 2 hetes lokális hüvelyi ösztrogén előkészítő kezelés után végezhető a kezelés. Más előkészületekre, valamint a kezelést követően fájdalomcsillapítókra, antibiotikumokra vagy egyéb gyógyszerekre nincs szükség. A páciens részéről nem szükséges egyéb előkészület, illetve utána azonnal visszatérhet a hétköznapi életbe. A **ProlapLase®** kezelés egy vágás-, metszés-, varrat-, sérülés-, vérzésmentes kezelés, mely gyakorlatilag nem jár fájdalommal. A kezelést követően nem képződik heg, nem kell számolni mellékhatásokkal. A gyógyulási időszak rendkívül gyors, mely időszak alatt nincs szükség fájdalomcsillapítókra és antibiotikumra. A kezelés rendkívül hatásos a gyenge vizelettartási panaszoknál is.

A klinikai tanulmányok érezhetően szűkebb hüvelycsatornáról, jelentősen javuló szexuális életről, örömteli élményekről számolnak be. Általában 3-4 kezelés javasolt, a kezelése között 3-4 hét szünettel. A kezeléseket követően már 2 nap után visszatérhetnek a szexuális élethez.

### Mennyire kellemetlen a kezelés?

A kezelést követően és azt követően sem kell kellemetlenséggel számolnia, csupán meleg érzést lehet érezni, amely könnyen enyhíthető helyi érzéstelenítő gélekkel.

### Mennyi ideig tart a kezelés?

A kezelést minden esetben megelőzi egy szakorvosi konzultáció. Maga a kezelés 3-4 alkalomból áll és alkalmanként 20 percet vesz igénybe.

### Mennyi idő a felépülés?

A kezelést követően nincs felépülési idő, így ön azonnal visszatérhet megszokott életviteléhez.

### Klinikai vizsgálatok és eredmények:

A Dr. Urska Bizjak-Ogrinc és Dr. Sabina Sencar által prezentált legutóbbi tudományos eredmények tisztán tükrözik, hogy a Fotona **ProlapLase®** lézeres kezelése biztonságos, hatékony és szövetkímélő megoldás a kismedencei szervek előesése esetén.

- az átlagos prolapsus fokozat jelentősen csökkent már az első kezelés után
- A prolapsus további javulást mutatott a későbbi kezelése során
- a kellemetlen kezelések száma alacsony, míg az elégedett páciensek száma magas volt.
- Nem jelentettek káros mellékhatást

### A kezeléseket végzi

**Dr Papp Zsolt**

szülész - nőgyógyász főorvos

**ProlapLase®**  
A kismedencei süllyedékes szervek  
Er: YAG SMOOTH lézer kezelése



**Dr. Pesthy Dénes**  
A Laser and Health Academy oktatója

H-9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 1.  
Tel.: +36 96 576 047, +36 20 934 33 58  
info@laserderm.hu  
www.laserderm.hu

